

 Chet elga sayohat qilishga tayyorgarlik ko'ryapsizmi?

Qizamiqning oldini olish qoidalari biliib oling va oldindan saqlaning!



1/7

Qizamiqning ta'rifi va belgilari

Bu yo'talish yoki aksirish kabi tomchilar va havo orqali tarqaladigan yuqumli kasallik bo'lib, o'ta yuqumli kasallikdir.

※ Qizamiqqa qarshi immuniteti etarli bo'limgan odam bermor bilan aloqa qilganda, ularning 90% dan ortig'i infektsiyalanadi.

Qizamiqning asosiy belgilari

(inkubatsiya davri 7-21 kun)

Prodromal davr



Toshma

Qayta tiklash davri



ya'nini yuqumli kasallikning yashirin davri. Bu juda yuqumli davr bo'lib, isitma, yo'tal, burun oqishi, kon'yunktivit va og'izda dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi.



Eritematoz toshmalar bo'yining orqa qismida, qulqo ostida, gavda, oyoq-qo'llar, kaftlar va oyoq tagida paydo bo'ladi.



Toshma yo'qolib, pigmentatsiya(dog'lar)ni qoldiradi.

* Bronxial pnevmoniya va krup, diareya va o'tkir ensefalist kabi nafas olish kasalliklari kabi asoratlar paydo bo'lishi mumkin


2/7

• Qizamiqning asosiy avj olgan mamlakatlar •

Dunyo bo'ylab qizamiq bilan kasallanish ko'paymoqda*va,
Xorijga sayohatlarning ko'payishi tufayli fuqarolarning
qizamiq bilan kasallanish ehtimoli ortib bormoqda.


• Qizamiq bilan kasallanganlarning hududlar bo'yicha taqsimlanishi •

Asosan Yevropa, Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyoda sporadik epidemiyalar va
epidemiyalar davom etmoqda



* 2023 yilda dunyo bo'ylab qizamiq bilan kasallanganlar soni taxminan 300,000 ni tashkil etadi
(JSST ma'lumotlariga ko'ra 2022 yilga nisbatan 1,8 baravar ko'p)

• Chet elga sayohat qilishda qizamiqning
oldini olish bo'yicha maslahatlar •



Sayohatdan oldin

- ✓ Qizamiqqa qarshi vaktsina (MMR) ning ikkala dozasini olganingizni tekshiring.
- ✓ Agar siz ikkala dozani ham olmagan bo'lsgiz yoki emlanganligingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, ketishdan 4-6 hafta oldin tibbiy muassasaga tashrif buyuring va 4 haftalik interval bilan ikkita dozani qabul qiling.



Sayohat davomida

- ✓ Odamlar gavjum joylarda niqob taqish, qo'l yuvish, yo'tal odobi kabi shaxsiy gigiena qoidalariiga rioya qiling.



Sayohatdan qaytayotganda

- ✓ Kirish paytida isitma yoki toshmalar bo'lsa, karantin xodimiga xabar bering.

• Agar mamlakatga kirgandan keyin isitma yoki
toshma kabi shubhali alomatlar paydo bo'lsa



Tibbiyot muassasalariga niqob taqish va boshqalar bilan
aloqani kamaytirgan holda tashrif buyuring.
(jamoat transportidan foydalanishdan voz kechish)



Tibbiyot xodimlariga
"chet elga sayohatlar tarixi" haqidagi ma'lumot berish



• Qizamiqqa qarshi emlash haqida nimalarni
bilishingiz kerak

• Yoshga qarab qizamiqqa qarshi emlash standartlari •

Yoshi	Emlash usuli
0 ~ 5 oylik	Vaktsinatsiyadan o'tkazilmaydi
6 oydan 11 oygacha (tezlashtirilgan emlash*)	Chet elga sayohat qilishda bir martalik emlash * Standart emlash taqvimi muqarrar ravishda bajarilmasa va immunitetni tezda olish kerak bo'lganda qo'llaniladi
12-15 oylik (o'z vaqtida emlash)	1-emlash
4-6 yosh (o'z vaqtida emlash)	2-emlash
Yoshlar va kattalar*	※ Immunitet haqida hech qanday dalil bo'limganda ikki doza (kamida bir marta) kamida 4 hafta oralig'da kiritiladi

* Agar siz 1968-yil 1-yanvargacha tug'ilgan bo'sangiz,
sizda qizamiqqa qarshi tabiiy immunitetga ega bo'lganligiz uchun emlash shart emas.

※ Qizamiqqa qarshi immunitet mavjud bo'lmasa

1968 yil 1 yanvardan keyin tug'ilgan, ilgari emlanmagan,
qizamiq bilan kasallanmagan yoki qizamiqqa qarshi tasdiqlangan
immunitetga ega bo'ligan odamlar.

2024.4.11.



**Chet elga chiqishdan oldin
qizamiqning oldini olish
qoidalari bilan tanishib chiqing
va sayohatingizni maroqli o'tkazing!**

